

佛波酯, 十四烷酰佛波醇乙酸酯 (TPA)

目录号	规格
FXP012	1.0 ml

浓度:	20 ug/ml(DMSO)
规格:	1.0 ml
组分:	PMA(phorbol 12-myristate 13-acetate) TPA (12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate)
工作浓度:	20-50 ng/ml
储存条件:	建议分装后-20°C 避光保存, 避免反复冻存。
有效期:	1 年

产品应用:

T 淋巴细胞激活剂; 皮肤粘膜潜在致癌剂。可在体内外激活蛋白激酶 C, 促进肝细胞 iNOS 的表达; 抑制由 Fas 诱导的细胞凋亡, 但可诱导 HL-60 白血病细胞凋亡。高度致癌活性及丝裂原活性。

用于体外刺激 T 淋巴细胞增殖。经 TPA 刺激后, 某些细胞转录因子, 或膜表面分子表达增加。

注意事项:

1. 使用本产品时应配戴手套。应注意避免任何途经的直接皮肤接触。
2. 此产品仅供研究, 不用于临床诊断

相关产品

货号	产品名称	应用
FXP010	刀豆蛋白 A, Concanavalin A (ConA)	FC
FXP011	植物血凝素, Phytohemagglutinin (PHA)	FC
FXP004	钙离子载体 A23187, Calcium Ionophore A23187	FC
FXP006	BFA, Brefeldin A	FC
FXP045	Monensin Solution (1,000X)	FC
FXP048	Cell Stimulation Cocktail (500X)	FC
FXP049	Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (500X)	FC
FXP050	Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X)	FC